


Feuilles découpées , pédoncule à une seule fleur , à poils dressés , comme ceux des sépales , bouton incliné.
Les deux sépales poilus tombent à la floraison.
4 pétales rouges à tache noire à la base,
froissés dans le bouton. Nombreuses étamines noires.
Plante messicole (champs cultivés), voire invasive.
Les pétales séchés , en tisane , ont un effet apaisant



papavéracées

Coquelicot
Papaver rhoeas





Les coquelicots et pavots ont un ovaire renflé, au sommet duquel les stigmates sont étalés comme des rayons. Les sépales sont vite caduques, les 4 pétales sont froissés, les étamines nombreuses. Le plus commun (*papaver rhoeas*) a de grands pétales rouges souvent tachés de noir à la base, une capsule (fruit) glabre, des poils dressés sur le pédoncule floral. C'est une plante messicole (des moissons). Ici, il est associé, non pas au bleuet, mais au buglosse (anchuze) azuré. (vallon de Lahlawt, mai)





Les stigmates sont disposés en rayons sur le disque de l'ovaire, prêts à recevoir le pollen.
L'ovaire se transformera en capsule qui libèrera les graines par des pores situés sous le disque des stigmates.





Dans un champ de petits pois.
Les herbicides ne sont pas
encore passés par là !