

Oléastre, olivier sauvage

oléacées

Olea europaea subsp oleaster

Zebbouj, berri

Forme sauvage ancêtre de l'olivier cultivé.
Les oléastres sont issus de noyaux, alors que les oliviers cultivés viennent de bouturage.

(vallon Tougalkhir-Anins, fin novembre



Fruits plus petits et moins charnus que ceux des oliviers domestiques

Maquis de basse montagne ensoleillée
(colline de Tassa Ourgane, versant sud , mars)





Oléastre=olivier sauvage

Deux formes sur un même pied :

- forme basse, buissonnante, touffue, épineuse, à petites feuilles rondes vert sombre;
- forme haute à rameaux allongés, feuilles lancéolées allongées , plus proches de celles de l'olivier cultivé, vert clair et coriaces dessus (résistance à la sécheresse), gris-argenté dessous. (khalwa, versant sud, décembre)



Les deux formes de l'oléastre

Forme haute à rameaux dressés allongés, feuilles opposées, ovales comme celles de l'olivier cultivé mais plus petites.



Forme basse, touffue, épineuse, à petites feuilles plus ou moins rondes.





Oléastre au bord de la falaise du jbel Ighriys.
Abondant . Au fond à gauche : le Tasghimout.



Falaise du Ghriss n'Wamou avril 17



Reboisement du Ghriss n'wamou
avril





vieux oléastres isolés sur une pente sèche , dans un très petit vallon (Sektana, mars)

