

## Anacardiacées

*Rhus tripartita*  
*Rhus oxyacantha*  
«jdari », « tizrha »

Arbuste saharo-méditerranéen très rameux ,  
à rameaux épineux et brun rougeâtre.  
Feuilles vert vif à trois folioles , la foliole centrale souvent  
nettement plus grande, et à 3-5 dents plus ou moins marquées.  
Inflorescence en petite grappe ramifiée. Minuscules fleurs  
verdâtres. Petit fruit en drupe.  
Sols calcaires secs et rocailleux, plaines et basses montagnes  
de l'intérieur. ( reboisement et barre calcaire de Ghriss n'Wamou,  
entre Aït Ouri r er Tidili, janvier)



Toutes premières fleurs.







Inflorescence  
de l'an passé.



*Rhus tripartita*

Accroché à la falaise sud du Tasghimout,  
février







*Rhus tripartita* ( anacardiacées)

Arbre dioïque : à gauche , le reste des étamines,  
À droite les fruits

*Rhus tripartita* falaise sud du Tasghimout)  
Fleurs mâles en février , puis sèches en avril



*Rhus tripartita*, fruits ( falaise sud Tasghimout, avril)





***Rhus tripartita* (Anacardiacées)**

En pleine floraison, odorant, les abeilles bourdonnent.  
( falaise jbel Ighriys , début janvier)







***Rhus tripartita***

( crête du Jbel Ighriys , fin janvier)  
(croquis d'un rameau avec divers  
types de feuilles , d'après la flore  
de R.Nègre)

